

CAMEROUN

Rapport de situation du Choléra dans
les régions du Nord, de l'Extrême-
Nord, du Sud-Ouest et du Littoral



20/01/2020



Formation à la potabilisation de l'eau,
District de santé Bibéri, © OMS



Organisation
mondiale de la Santé

FAITS SAILLANTS

- Nouvelle chaîne de transmission active dans la région du Littoral

- du 04 au 20 janvier 2020

- 19 nouveaux cas avec 5 décès enregistrés dans la région du Littoral provenant des districts de santé Nylon, Manoka, Boko et Deïdo ;
 - 06 rumeurs de cas avec 03 décès communautaires enregistrés dans la région du Sud-Ouest, district de santé d'Ekondo Titi, aire de santé de Bamusso ;
 - Aucun nouveau cas enregistré dans les régions du Nord depuis la semaine épidémiologique 51 (2019) et de l'Extrême-Nord depuis la semaine épidémiologique 48 (2019) ;
- Pour l'ensemble des quatre régions (Nord, Extrême-Nord, Sud-Ouest et Littoral), depuis la date de déclaration de l'épidémie :
- 2 222 cas avec 117 décès enregistrés ;
 - Taux de létalité : 5,3% ;
 - 201/371 cas confirmés au laboratoire.


SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

L'épidémie de choléra actuellement en cours au Cameroun a débuté le 18 mai 2018 dans la région du Nord et a affecté les régions du Nord, du Centre (72 cas avec 01 décès), du Littoral, de l'Extrême-Nord et du Sud-Ouest. En 2019, Seules les régions du Nord, de l'Extrême-Nord et du Sud-Ouest ont enregistré des cas.


Depuis le début de l'année 2020, seules les régions du Sud-Ouest et du littoral enregistrent des cas.

La région du Littoral a enregistré ses premiers cas en 2018. Une nouvelle flambée a été détectée le 04/01/2020. Les cas enregistrés dans la région du Littoral en 2018 (07 cas, 0 décès) ne sont pas pris en compte dans le présent rapport.

Les cartes suivantes présentent les zones touchées par le choléra depuis 2018. Un accent particulier est mis sur les régions du littoral et du Sud-Ouest qui enregistrent encore des cas.



Carte 1 : Régions et districts affectés par le choléra au Cameroun depuis le début de l'épidémie en mai 2018



Carte 2 : Districts et aires de santé affectés par le choléra dans les régions du Sud-Ouest et du Littoral au 20/01/2020

DANS LA RÉGION DU NORD




Figure 1 : Courbe épidémique des cas de choléra par semaine épidémiologique dans la région du Nord en 2018 et en 2019

- Aucun nouveau cas enregistré depuis la 51^e semaine épidémiologique 2019 dans la région ;
- 13/15 districts de santé ayant enregistré des cas suspects (Bibémi, Figuil, Garoua I, Garoua II, Gashiga, Golombe, Guider, Mayo Oulo, Ngong, Pitoa, Poli, Lagdo, Tcholliré) ;
- Au total, depuis le 18 mai 2018 :
 - o 1212 cas enregistrés avec 62 décès (en 2019 la région a enregistré 581 cas avec 22 décès) ;
 - o Taux de létalité : 5,1% ;
 - o 165/265 échantillons confirmés au laboratoire ;
 - o Âge médian : 27 ans (1 - 86 ans).





Figure 2 : Courbe épidémique des cas de choléra, région de l'Extrême-Nord en 2019



RÉGION DU SUD-OUEST

- 01 nouvelle aire de santé ayant enregistré des rumeurs de cas : Bamusso ;
- Rumeur de 06 nouveaux cas suspects dont 03 décès communautaires enregistrée (l'investigation est en cours pour confirmation) ;
- 02 districts de santé ont enregistré des cas (Bakassi et Ekondo Titi) ;
- Il y a une difficulté de collecte des données sur les cas en communauté du fait de l'insécurité ;
- Au 20/01/2020
 - o 380 cas enregistrés avec 16 décès communautaires ;
 - o Taux de létalité : 4,2%.




Figure 3 : Courbe épidémiques des cas de choléra dans la région du Sud-Ouest par semaine épidémiologique au 20/01/2020

DANS LA RÉGION DE L'EXTREME-NORD

- Aucun nouveau cas rapporté depuis la semaine épidémiologique 48-2019 ;
- 07/30 districts de santé ayant enregistré des cas notamment Kaélé, Kar Hay, Moutourwa, Guidiguis, Maroua 1 et Maroua 2 en 2019 ainsi que Makary en 2018 ;
- Au total, depuis le 04/10/2018 :
 - o 629 cas avec 34 décès enregistrés (350 cas enregistrés avec 17 décès enregistrés en 2019) ;
 - o Taux de létalité : 5,4% ;
 - o Âge médian : 25 ans (0,5 - 86 ans).



RÉGION DU LITTORAL

- 04 Districts de santé affectés respectivement (Nylon, Manoka, Boko, Deïdo) ;

- Tous les districts de santé affectés sont situés sur les berges de l'Océan Atlantique, avec une possible communication avec le Sud-Ouest en termes de déplacement des populations par voie fluviale ;

- Au 20/01/2020

- 19 cas enregistrés avec 05 décès communautaires ;
- 141 sujets contacts suivis ;
- Taux de létalité : 26,3% ;
- 02/03 cas confirmés au laboratoire ;




Figure 4 : Courbe épidémiques des cas de choléra dans la région du Littoral par date de début des symptômes au 20/01/2020



ACTIVITÉS MENÉES

Coordination

- Tenue des réunions à tous les niveaux (Comité Régional, Système de Gestion des incidents, comités locaux d'arrondissement) dans les régions du Nord, du Littoral et du Sud-Ouest ;
- Appui technique des partenaires OMS et UNICEF dans la coordination des activités de réponse à l'épidémie dans les régions affectées.

Surveillance : Investigation

- Poursuite de la recherche des cas en communauté (dans les régions du Nord et du Littoral) et mise à jour de la liste linéaire des cas ;
- Suivi des sujets contacts ;
- Appui en intrants pour le transport des échantillons vers le laboratoire
- Investigation réalisée dans le district de santé Manoka, hotspot dans la région du Littoral.

Prise en charge des cas

- Identification des besoins pour la prise en charge des cas dans la région du littoral ;

Mise en place d'une UTC au Centre Médical d'Arrondissement de Bamusso (région du Sud-Ouest) équipé avec l'appui de OMS et MSF ;

- Briefing des équipes cadre de district ainsi que des chefs des aires des districts de santé de la région du Littoral sur la détection et la prise en charge des cas.

Vaccination

- Préparation du 2^{ème} tour de vaccination contre le choléra dans les régions du Nord et du Sud-Ouest (en janvier 2020).

WASH

- distribution d'Aquatabs par REO dans la région du Sud-Ouest ;
- Plaidoyer et sensibilisation pour la désinfection des bateaux en direction/quittant de Bamusso avec l'appui des propriétaires et des forces de défense nationale ;
- Mentor Initiative, partenaire d'implémentation de Solidarités Internationale déployés sur le terrain pour un début prochain des interventions WASH.

Communication et mobilisation sociale

- Relais communautaires de REO déployés sur le terrain pour des actions de sensibilisation ;
- Coordination des interventions de sensibilisation contre le choléra dans la région du Sud-Ouest.
- Diffusion des outils de sensibilisation contre le choléra dans les districts de santé de la région du Littoral et dans les médias de proximité.

GAPS

Coordination

- Renforcement de la coordination de la réponse dans la région du Littoral ;
- Ressources financières pour mener la réponse

Communication

- Support de sensibilisation ;
- Communication pour limiter la stigmatisation des cas.

Prise en charge des cas

- Formation du personnel dans la prise en charge des cas ainsi que dans l'accompagnement des familles des malades ;
- Personnels additionnels pour appuyer la réponse dans le Sud-Ouest.

WASH

- Accès à l'eau potable ;
- Sensibilisation aux bonnes pratiques de potabilisation de l'eau.

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE DES PARTENAIRES

- Extrême-Nord : OMS, UNICEF, MSF, UNFPA, CRF, CRC, Plan ;
- Nord : OMS, UNICEF, MSF, UNFPA, CRF, CRC ;
- Sud-Ouest : OMS, UNICEF, MSF, REO
- Littoral : OMS, IMC,